



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Product Information Information du Produit



Pour favoriser un traitement efficace, les conseils suivants devraient être communiqués au parent ou au tuteur qui administre Biaxin pour enfants à un jeune patient :



- **Ne doit pas être réfrigéré** – le froid peut modifier le goût du médicament;
- Dans le cas des enfants difficiles, Biaxin pour enfants peut être pris avec de la nourriture (p. ex., yogourt, lait, compote de pommes, jus);
- Pour administrer une dose complète aux jeunes enfants, assurez-vous que la seringue est bien positionnée à l'arrière de leur bouche;
- Pour éviter tout arrière-goût ou goût amer, rincez-leur la bouche avec de l'eau ou du jus après la prise du médicament;
- Agitez le médicament modérément. Une agitation trop forte peut altérer son goût;
- Donnez l'antibiotique jusqu'à la fin du traitement (de 5 à 10 jours selon l'ordonnance). Respectez cette directive – *même si votre enfant se sent mieux* – à moins d'indication contraire de votre médecin ou pharmacien.

Biaxin pour enfants est indiqué dans le traitement de l'**otite moyenne aiguë (OMA)** à *H. influenzae*; à *M. catarrhalis* ou à *S. pneumoniae*; de la **pneumonie extra-hospitalière (PEH)** légère ou modérée à *S. pneumoniae*; à *C. pneumoniae* ou à *M. pneumoniae*; et de la **pharyngite** à *S. pyogenes*.

Les effets secondaires les plus fréquents de type troubles gastro-intestinaux (selon le classement par système organique) sont la diarrhée (7 %), les vomissements (7 %), les douleurs abdominales (3 %), la dyspepsie (3 %) et les nausées (1 %).

La clarithromycine est contre-indiquée en association avec l'astémizole, la terféndatine, le cisapride, le pimozide, l'ergotamine ou la dihydroergotamine.

© Laboratoires Abbott, Limitée  
Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1

[www.abbott.ca](http://www.abbott.ca)  
1-800-361-7852

Monographie du produit  
offerte sur demande.



Référence

1. Monographie de Biaxin. Laboratoires Abbott, Limitée. Le 10 novembre 2008.



\* Une promesse pour la vie

**Si vous désirez recevoir PharmaDirect par courriel, s'il vous plaît fournir votre adresse de courriel :**

Nom: \_\_\_\_\_

Courrier électronique: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Courrier électronique: \_\_\_\_\_


Télécopier: 1-800-420-3616

**Visit us at / Visitez-nous à**  
**[www.ipharmadirect.com](http://www.ipharmadirect.com)**  
**pour soumettre votre petite**  
**annonce gratuite.**



**Avec la concentration de 250 mg/5 mL, les enfants ne prennent que la moitié de la quantité<sup>1†</sup>**

Exemple de volume à administrer pour une dose chez un enfant de 30 à 40 kg<sup>1</sup>



† comparativement à la concentration usuelle de 125 mg/5 mL.

<sup>1</sup> 15 mg/kg/jour (en deux prises fractionnées toutes les 12 heures) indépendamment de la durée du traitement ou de l'indication, sans dépasser 1 000 mg/jour<sup>1</sup>.

© Laboratoires Abbott, Limitée  
Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1

Monographie du produit  
offerte sur demande.



\* Une promesse pour la vie

