

Product Information  Information du Produit®



ANDRIOL® À 40 MG – NOUVELLE NOTICE DE CONDITIONNEMENT

La présente vise à vous informer que la quantité de comprimés contenus dans l'emballage de ♦ANDRIOL® (capsules d'undécanoate de testostérone) à 40 mg passera de 120 capsules (12 plaquettes de 10 capsules) à 60 capsules (6 plaquettes de 10 capsules). Ce changement aura lieu au cours des prochaines semaines, après l'écoulement des stocks de l'emballage actuel.

En plus du changement de conditionnement, le code CUP sera également modifié, comme indiqué dans le tableau suivant :

PRODUIT	DIN	NOUVEAU CODE CUP	NOUVEAU CONDITIONNEMENT
ANDRIOL® Capsules de 40 mg	00782327	620959 140604	6 plaquettes de 10 capsules

Veillez noter que ces modifications n'auront aucune incidence sur le prix des capsules individuels d'ANDRIOL® à 40 mg.

Si vous avez des questions au sujet d'ANDRIOL®, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information à la clientèle de Merck au 1-800-567-2594.

Pour commander ANDRIOL®, veuillez communiquer avec le Service des commandes de Merck au 514-428-3200 ou au 1-800-463-7251. Les commandes peuvent également être transmises par télécopieur au 514-428-4912 ou au 1-800-563-7251.

© Marque déposée de N.V. Organon, utilisée sous licence.

Mise à jour

Liste de médicaments du Québec

ATTENTION : PHARMACIENS DU QUÉBEC

À compter du 3 octobre 2011, W2W Technologies (Calgary, Alberta), les promoteurs de CLOMID® (citrate de clomifène) ont le plaisir d'annoncer que CLOMID® a reçu l'inscription complète au formulaire du Québec (RAMQ).

CLOMID® est une marque de commerce déposée de Sanofi-aventis (Laval, Québec). W2W Technologies est le gestionnaire et le créateur de familles depuis 1993. Contactez-nous sans frais au 1.888.828.0828


Si vous désirez recevoir PharmaDirect par courriel, s'il vous plaît fournir votre adresse courriel :

Nom: _____


Courrier électronique: _____

Nom: _____


Courrier électronique: _____

 Pour favoriser un traitement efficace, les conseils suivants devraient être communiqués au parent ou au tuteur qui administre Biaxin pour enfants à un jeune patient :


- **Ne doit pas être réfrigéré** – le froid peut modifier le goût du médicament;
- Dans le cas des enfants difficiles, Biaxin pour enfants peut être pris avec de la nourriture (p. ex., yogourt, lait, compote de pommes, jus);
- Pour administrer une dose complète aux jeunes enfants, assurez-vous que la seringue est bien positionnée à l'arrière de leur bouche;
- Pour éviter tout arrière-goût ou goût amer, rincez-leur la bouche avec de l'eau ou du jus après la prise du médicament;
- Agitez le médicament modérément;
- Donnez l'antibiotique jusqu'à la fin du traitement (de 5 à 10 jours selon l'ordonnance). Respectez cette directive – *même si votre enfant se sent mieux* – à moins d'indication contraire de votre médecin ou pharmacien.



Biaxin pour enfants est indiqué dans le traitement de l'otite moyenne aiguë (OMA) à *H. influenzae*, à *M. catarrhalis* ou à *S. pneumoniae*; de la pneumonie extra-hospitalière (PEH) légère ou modérée à *S. pneumoniae*; à *C. pneumoniae* ou à *M. pneumoniae*; et de la pharyngite à *S. pyogenes*.
 Les effets secondaires les plus fréquents de type troubles gastro-intestinaux (selon le classement par système organique) sont la diarrhée (7 %), les vomissements (7 %), les douleurs abdominales (3 %), la dyspepsie (3 %) et les nausées (1 %).
 La clarithromycine est contre-indiquée en association avec l'astémizole, la terfénadine, le cisapride, le pimoziide, l'ergotamine ou la dihydroergotamine.

© Laboratoires Abbott, Limitée www.abbott.ca Monographie du produit
 Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1 1-800-361-7852 offerte sur demande. 

BIAXIN® enfants
 CLARITHROMYCINE EN SUSPENSION

Référence
 1. Monographie de Biaxin. Laboratoires Abbott, Limitée. Le 31 août 2009.  **Abbott**
 A Promise for Life®

* Une promesse pour la vie

Product Information  Information du Produit®



BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA


En date du 14 Octobre, 2011, la Société Bristol-Myers Squibb Canada a décidé de cesser la vente du produit suivant.

PRODUIT	Code de produit	Prés. unitaire	D.I.N.	C.U.P.
Capoten 25mg 100's	1 x 100 tabs	100's	00546283	623131000048

Si vous avez des questions concernant cet avis, n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle de Bristol-Myers Squibb Canada au 1-800-267-0005.

La Société Bristol-Myers Squibb Canada vous remercie de votre appui continu.




15 mg/kg/jour*
en deux prises fractionnées toutes les 12 heures.

Avec la concentration de 250 mg/5 mL, les enfants ne prennent que la moitié de la quantité[†]


Exemple de volume à administrer pour une dose chez un enfant de 30 à 40 kg[†]

250 mg/5 mL




5 mL

125 mg/5 mL




10 mL

† comparativement à la concentration usuelle de 125 mg/5 mL. † 15 mg/kg/jour (en deux prises fractionnées toutes les 12 heures) indépendamment de la durée du traitement ou de l'indication, sans dépasser 1 000 mg/jour*.

© Laboratoires Abbott, Limitée www.abbott.ca Monographie du produit
 Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1 offerte sur demande. 


BIAXIN® enfants
 CLARITHROMYCINE EN SUSPENSION

* Une promesse pour la vie  **Abbott**
 A Promise for Life®

LE SON DE BLÉ – LA NORME ABSOLUE DE SANTÉ CANADA EN MATIÈRE DE RÉGULARITÉ¹

Toutes les fibres ne se valent pas.

AUGMENTATION MOYENNE DU POIDS DES SELLES PAR GRAMME DE FIBRES INGÉRÉ



Il existe divers types de fibres et elles agissent différemment dans l'organisme. Les fibres favorisent la régularité parce qu'elles augmentent le poids des selles. Le tableau ci-contre présente une méta-analyse combinant les résultats de 140 études et résume la capacité de différents types de fibres à augmenter le poids des selles.^{2,3}

Conseils en matière de santé du système digestif

Voici quelques conseils à prodiguer à vos patients pour aider leur système digestif à bien fonctionner et leur laisser une remarquable sensation de bien-être.



1. Adoptez un régime équilibré, comprenant des aliments qui contiennent des fibres de son de blé, parce qu'elles sont les meilleures fibres pour favoriser la régularité. Vous pourriez ajouter des céréales et des barres **All-Bran*** à vos recettes préférées : la première source de fibre de ces produits est le son de blé.
2. Augmentez lentement votre consommation de fibres, pour que votre corps s'ajuste progressivement à ce changement. Par exemple, commencez par une cuillère à soupe de céréales **All-Bran Buds***, puis augmentez la quantité progressivement jusqu'à ½ tasse par jour.
3. Si vous augmentez votre consommation de fibres, n'oubliez pas d'augmenter également votre consommation de liquide. Visez au moins neuf tasses d'eau et d'autres boissons chaque jour.
4. Soyez actif tous les jours pour aider votre système digestif à fonctionner facilement. Visez la pratique de 30 à 60 minutes d'activité physique par jour.

Commandez GRATUITEMENT des trousse All-Bran* d'information relative à la régularité pour vos patients

Contenu :

- 1 bloc de feuillets d'information éducatifs à détacher avec coupons
- 24 échantillons de céréales **All-Bran Buds*** en sachet (23 g)

Commandez dès aujourd'hui ! C'est rapide et facile... Rendez-vous sur www.pharmalink.com/allbran

RÉFÉRENCES :

1. Santé Canada. Lignes directrices pour la planification et l'examen statistique des études cliniques traitant de l'effet des fibres alimentaires sur la fonction intestinale. Santé Canada, Ottawa (Ontario), 1994.
2. Institute of Medicine of the National Academies of Sciences. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. The National Academies Press, Washington, DC, 2002-2005.
3. Cummings JH. The effect of dietary fibre on fecal weight and composition (pages 263-333). In : Spiller GA, ed. CRC Handbook of Dietary Fibre in Human Nutrition. CRC Press, Boca Raton FL, 1993.