

Faites de CONTRAVE une partie de leur cheminement de gestion de poids

Maintenant en pharmacie!



Voici CONTRAVE...

CONTRACE est indiqué en complément d'un régime alimentaire hypocalorique et d'une augmentation du niveau d'activité physique pour la prise en charge du poids à long terme chez les adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial de :










- 30 kg/m² ou plus (obèses) ou
- 27 kg/m² ou plus (en surpoids) en présence d'au moins une comorbidité liée au surpoids (p. ex., hypertension traitée, diabète de type 2 ou dyslipidémie).



La dose quotidienne recommandée de **CONTRACE** est de deux comprimés deux fois par jour^{1*}

Afin de réduire au minimum le risque de convulsions, il ne faut pas dépasser la dose quotidienne maximale

La dose de **CONTRACE** doit être augmentée selon le calendrier suivant :

	 Dose du matin	 Dose du soir
Semaine 1		
Semaine 2		
Semaine 3		
Semaine 4 et suivantes		

D'après la monographie de produit¹

La dose **maximale** recommandée est de **32 mg/360 mg** par jour (deux comprimés deux fois par jour).

La réponse au traitement doit être évaluée après 12 semaines de traitement à la dose d'entretien. Si un patient n'a pas perdu au moins 5 % de son poids initial, il faut arrêter l'administration de CONTRAVE, car il est peu vraisemblable que le patient obtiendra et maintiendra une perte de poids significative sur le plan clinique en prolongeant le traitement.

Des modifications posologiques sont nécessaires chez les sujets atteints d'insuffisance hépatique (dose maximale recommandée d'un comprimé le matin chez les patients atteints d'insuffisance hépatique légère ou modérée) ou d'insuffisance rénale (dose maximale de deux comprimés, un comprimé le matin et un comprimé le soir chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée ou sévère) et dans les cas d'une utilisation concomitante d'inhibiteurs de l'isozyme CYP2B6 (dose maximale de deux comprimés, un comprimé le matin et un comprimé le soir). CONTRAVE ne doit pas être pris avec des repas riches en gras. **Les comprimés ne doivent pas être coupés, mâchés ou broyés.**

Veuillez consulter la monographie de produit complète à https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00044166.PDF pour les contre-indications, les mises en garde et les précautions les plus importantes, les effets indésirables, interactions médicamenteuses, les recommandations posologiques and les conditions d'utilisation clinique.

Il est également possible de se procurer la monographie de produit en téléphonant au **1 800 361-4261**.

* Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements complets sur la posologie et l'administration.

Référence : 1. Monographie de CONTRAVE. Valeant Canada LP, 12 février 2018.

