



Traitement de source naturelle des boutons de fièvre

Réduit la guérison des boutons de fièvre, en moyenne, de **4 jours' + soulage la douleur** associée aux boutons de fièvre.

Qu'est-ce que FEUSAUVAGE-FX®?

FEUSAUVAGE-FX® contient de la Propolis ACF®¹ (complexe de flavonoïdes antiviral), un extrait breveté hautement purifié dérivé de la substance résineuse recueillie par les abeilles provenant d'une région particulière du **Canada**. Il a été démontré que ses composants réduisent efficacement la durée des boutons de fièvre¹.

CUP 627207190022 Article # 005300 NPN 80021252

Comment FEUSAUVAGE-FX® agit²

- Sans traitement, un feu sauvage typique dure environ 8 à 10 jours (Figure 1)³
- Inactivation directe du virus (activité virucide)
- Inhibition de la multiplication du virus à l'intérieur des cellules infectées.
- Soulage la douleur et l'inconfort grâce à ses activités anti-inflammatoires et anesthésiques
- Stimule la régénération du tissu conjonctif pour accélérer le processus de la guérison

Phases du feu sauvage





Figure 1. Stades du feu sauvage. Un feu sauvage typique dure 8 à 10 jours³.

**On peut utiliser FEUSAUVAGE-FX® à n'importe quel stade du cycle des feux sauvages.
Sans traitement, un feu sauvage typique prend environ 8 à 10 jours à guérir³.**

En quoi FEUSAUVAGE-FX[®] diffère d'Abreva[®]?

FEUSAUVAGE-FX[®] NPN 80021252

Abreva[®] DIN 02245677

Type d'ingrédient pour le traitement des feux sauvages	Ingrédient médicinal de source naturelle	Substance chimique
Ingrédient médicinal	Propolis ACF ¹ canadienne normalisée à 3 % (complexe antiviral de flavonoïdes)	Docosanol à 10 %
Temps de guérison	Raccourcit le temps de guérison des feux sauvages de 4 jours en moyenne. Soulage la douleur associée aux boutons de fièvre.	Le délai médian de guérison d'un feu sauvage à l'aide d'Abreva est de 4,1 jours lorsqu'on l'utilise dès le premier signe. Réduit la durée de douleur, de brûlure, de démangeaison et de picotement.
Dose recommandée et administration	Adultes : Application topique à tout moment, 4 à 6 fois par jour. 	Adultes et enfants de 12 ans et plus : Se laver les mains, puis appliquer la quantité requise d'ABREVA [®] sur le bout du doigt ou un coton-tige. Ensuite, faire pénétrer ABREVA [®] doucement, mais complètement, dans la région du feu sauvage. Répéter 5 fois par jour, pendant 10 jours maximum, jusqu'à la guérison de la lésion. Commencer le traitement le plus tôt possible, de préférence dès les premiers symptômes ou signes d'une poussée (démangeaison, brûlure, picotement ou rougeur), car une intervention précoce importe pour obtenir les meilleurs résultats.

Dose recommandée : Adultes: Application topique à tout moment, 4 à 6 fois par jour.

Ingrédient médicinal : Propolis ACF¹ canadienne normalisée, quantité par unité posologique de 30 mg* par gramme d'onguent (3 %).

*Équivalent végétal séché de 100 mg, ration d'extraction de 3.3:1.

Mise en garde : Peut irriter la peau; tester la réaction de la peau avant utilisation. Cesser l'utilisation si une éruption cutanée apparaît. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas utiliser durant la grossesse ou l'allaitement. Consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous êtes allergique aux produits d'abeilles, aux peupliers ou baume du Pérou, et si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients.

Conserver à moins de 25°C.



DOCUMENT CONFIDENTIEL : La copie, la distribution et l'affichage externe de ce document dans les aires visibles d'interactions avec les patients sont interdits. Ce document est strictement réservé à l'usage des professionnels de la santé pour comprendre les données cliniques et scientifiques à l'appui des produits FEUSAUVAGE-FX[®]. Veuillez noter que les données ne sont pas approuvées par Santé Canada; consultez le NPN applicable (80021252) pour connaître les indications autorisées au Canada. Indiquez toujours au patient de lire l'étiquette et de respecter le mode d'emploi. Pour toute question, appelez au 1-888-843-7239.

Références :

1. †Marque déposée de Lisoma International Ltd., UK. Distribué par Valeant Canada LP/S.E.C., H7L 4A8 sous licence de Lisoma Canada Ltd., R3N 0K1.
2. O Hoheisel MD. The Effect of Herstat (3% Propolis Ointment ACF) application in cold sores: a double-blind placebo-controlled clinical trial. The Journal of Clinical Research 2001, Volume 4, pp 65-75
3. Fiche Technique Santé-Sécurité : Agents Pathogènes – Herpes simplex virus. Gouvernement du Canada. <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/fiches-techniques-sante-securite-agents-pathogenes-evaluation-risques/virus-herpes-simplex.html> Consultée le 14 mai 2018